



MANUAL DE DOSIFICACIÓN HIPO PURÍN PARA APLICAR EN BALSAS DE PURINES

A continuación se indican los pasos a seguir para la dosificación del producto según los m³ de la balsa. **Ver documento “Dosis HIPO PURÍN”**

Para su dosificación se recomienda seguir las indicaciones que se exponen a continuación.

Instrucciones de uso de la bacteria Hipo purín

Rehidratación del producto

Coloque el producto en un recipiente limpio. Incorpore una cantidad de agua 5 veces mayor a la dosificación de microorganismos, el agua debe ser limpia y estar tibia (30°C), remueva bien y deje reposar durante al menos 30 minutos antes de la dosificación.

Aplicación de Hipo purín en la balsa

- La dosis inicial debe introducirse en la balsa inmediatamente después de vaciarla.
- La dosis de mantenimiento se inicia una semana después de la dosis inicial, esta debe de continuar una vez por semana durante toda la temporada de alojamiento.
- El punto de dosificación debe estar en **la entrada del sistema de almacenamiento**.

Características del producto: Preparado seco que contiene bacterias naturales inofensivas estabilizadas sobre una base de cereales.

Temperatura de almacenamiento: 0 - 45°C.

Vida útil: 2 años.

Rango de pH: 5,0-9,0.

Embalajes disponibles: Baldes de 10 y 20 kg.